

Lisa 1. Valuraha ja püsiva puude

hüvitiste tabel

1. Valuraha

Kolju vigastused **Protsent**

1. Koljuluude murrud:

1) koljuvõlvi murd	10 %
2) koljupõhimiku murd	15 %
3) koljuvõlvi ja –põhimiku murd	20 %

2. Koljusisesed verevalumid:

1) epiduraalne	10 %
2) subduraalne, ajusisene	15 %

3. Peasaju kahjustused:

1) ajuväpustus ehk koomatsioon	2 %
2) ajupõrutus, subarahnoidaalne verevalum (kontusioon)	10 %

4. Pea, seljaaju ja perifeerse närvisüsteemi kahjustused:

1) seljaaju põrutus	7 %
2) traumaatiline epilepsia	15 %

5. Traumaatiline pksiid **10 %**

Nägemisorganid **Protsent**

6. Ühe silma pisarkanalite läbimatus **10 %**

7. Silma trauma järgne:

1) konjunktiviit, keratiit, iridokükliit, koorionretiniit	5 %
2) vikerkesta defekt, läätse luksatsioon, trihhiaas, lau pöördumine, eemaldamata võõrkehad silmamunas	10 %

8. Silmakesti läbivad haavad, II-III järgu põletus (söövitus), hemoftalm ilma nägemisteravuse languseta **5 %**

9. Silmamuna eemaldamine (enukleatsioon) **10 %**

10. Orbita murd **10 %**

11. Nägemisteravuse langus toodud nägemisteravuse languse tabelis **vt tabel**

Märkus: Nägemisorganite vigastuse suurus määratakse ravijärgselt, mitte varem kui 3 kuud pärast kindlustusjuhtumit, järelkontrollis täidetud arstitõendi alusel.

Kuulmisorganid **Protsent**

12. Kuulmisteravuse langus ühest kõrvast 60-89 db 5 %

Märkus: Kuulmisteravuse langus määratakse audiomeetriliselt ravijärgselt, kuid mitte varem kui 3 kuud pärast kindlustusjuhtumit.

13. Kopsu vigastus, nahaalne õhkemfüseem, hemo-, pneumotooraks, eksudatiivne pleuriit, võõrkeha rindkereõõnes, pneumoonia (v.a hüpostaatiline või postoperatiivne):

1) ühepoolne	5 %
2) kahepoolne	10 %

Hingamisorganid **Protsent**

14. Ninaluu, otsmiku- ja ninakõrvalkoopa eesseina murd **3 %**

15. Kopsu vigastus, nahaalne õhkemfüseem, hemo-, pneumotooraks, eksudatiivne pleuriit, võõrkeha rindkereõõnes, pneumoonia (v.a hüpostaatiline või postoperatiivne):

2) neeru õmblus	10 %
-----------------	------

1) ühepoolne	5 %
2) kahepoolne	10 %

16. Rinnaku murd **5 %**

17. Ühe roide röntgenograafiliselt tõendatud murd 1-2 %

18. Trauma tõttu teostatud:

1) torakoskoopia, torakotsentees	5 %
2) torakotoomia	10 %

19. Kõri, hingetoru (trahhea) vigastused, bronhoskoopia, trahheotoomia **2-10 %**

Südame-veresoonkonna süsteem **Protsent**

20. Südame, südamekestade ja suurte magistraalveresoonte vigastused **15 %**

Seedetrakt **Protsent**

21. Sarna-, üla-, alalõualuu murd

1) ühe luu	5 %
2) mitme luu, hulgimurd	10 %

Märkus: Harjumuslikku nihetust ja selle retsidiive ei loeta kindlustusjuhtumiks.

22. Neelu, söögitoru, mao, soolte vigastused (haavamine, rebend, söövitus), ösofagoskoopia ja gastrooskoopia **5 %**

23. Vigastuse järgne:

1) mao, soolte, pära armistumisest tingitud ahenemine	15 %
2) liiteline haigus	25 %
3) soole, soole-tupe, soole-kõhunäärme uuris	50 %

24. Maksa vigastused või kahjustused ägeda juhusliku mürgituse tagajärjel:

1) trauma raviga tekkinud seerumhepatiit	5 %
2) maksapuudulikkus	10 %

25. Trauma tõttu:

1) maksa kapsialune rebend, operatsioonita, diagnoositakse CT või UH põhjal	5 %
2) maksarebendi õmblus	10 %
3) sapipõie rebendist peritoniit	15 %

26. Põrna kapsialune rebend, operatsioonita, diagnoositakse CT või UH põhjal: **5 %**

27. Seedetrakti vigastuse järgne:

1) mao, kõhunäärme, soole õmblus	15 %
2) kõhunäärme ebfistul	20 %
3) mao, soole, kõhunäärme reseksioon	30 %

28. Kõhu vigastuse tõttu diagnostilisel eesmärgil tehtud (ei arvestata lisaks punktidele 22 - 27):

1) laparoskoopia (laparotsentees)	5 %
2) laparotoomia	10 %

Märkus: Punktid 22-24 peavad olema diagnoositud kas endoskoopiliselt, laparoskoopiliselt või laparotoomiaga.

Eritus- ja suguorganite süsteem **Protsent**

29. Neerude vigastused:

1) kapsialune rebend, operatsioonita, diagnoositakse CT või UH põhjal	5 %
---	-----

30. Kuseteede operatsioonid:

- | | |
|----------------------------------|------|
| 1) epitsüstostoomia | 5 % |
| 2) kuseteede õmblus, lumbotoomia | 10 % |

31. Kuse-suguelundite haavamised, rebendid, põletus **5 %****32. Trauma tõttu ühe munandi, munasarja, -juha eemaldamine** **10 %****42. Õlavarreluu:**

- | | |
|------------------|------|
| 1) diafüüsi murd | 15 % |
| 2) hulgemurd | 20 % |

10/14 ÕJ010-2016 Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused

Pehmed koed **Protsent****33. Näo, kaela eespinna armidest põhjustatud kosmeetilised defektid:**

- | | |
|---|--------|
| 1) väljendunud (ei muuda oluliselt näo kuju), armid pindalaga üle 1 cm ² | 1-10 % |
| 2) tugevalt väljendunud (muudab oluliselt näo kuju) | 30 % |
| 3) näo täielik moondumine (masknägu) | 70 % |

34. Tugeva keloidiga põletushaavade armid kehal:

- | | |
|------------------------|------|
| 1) 1-2% kehapinnast | 10% |
| 2) 3-4% kehapinnast | 15 % |
| 3) 5-6% kehapinnast | 20 % |
| 4) 7-8% kehapinnast | 25 % |
| 5) 9-10% kehapinnast | 30 % |
| 6) üle 10% kehapinnast | 35 % |

Märkus: Pehmete kudede vigastuse suurus määratakse 3 kuud pärast kindlustusjuhtumit. Punkti 33 alapunktis 1 toodud vigastuse puhul annab armi 1 cm² õiguse valuraha 1%le.

Lüüsammas **Protsent****35. Lülikehade, -kaarte, -liigesjätkete, ogajätke murd:**

- | | |
|---------------|--------|
| 1) 1-2 lüülil | 5-10 % |
| 2) 3-5 lüülil | 25 % |

36. Ühe lüli ristjätke murd **3 %****37. Ristluu murd** **10 %****38. Sabaluu murd** **5 %****Aba- ja rangluu** **Protsent****39. Aba-, rangluu murd, akromio-klavikulaar, sternoklavikulaarliigese rebend:**

- | | |
|--|------|
| 1) ühe luu murd, ühe liigese rebend | 5 % |
| 2) kahe luu murd koos ühe liigese rebendiga | 10 % |
| 3) kahe liigese täielik rebend, kahe liigese täielik rebend koos nihestusega või ühe luu murruga või ühe luu murru ja nihestusega, kahe luu murd koos ühe liigese rebendi ja nihestusega | 15 % |
| 4) rangluu ebaliiges | 10 % |

Õlaliiges **Protsent****40. Õlaliigese vigastused:**

- | | |
|---|------|
| 1) luufragmentide ärarebimismurd | 5 % |
| 2) kahe luu murd, liigesenapa murd, abaluumurd koos õlaliigese nihestusega, uuringutel tõestatud kõõluste ja/või liigesekapsli rebend | 10 % |
| 3) õlavarreluu pähiku, kirurgilise või anatoomilise kaela murd, õlavarreluu murd koos nihestusega | 15 % |
| 4) õlavarreluu killustunud hulgemurd õlaliigeses | 20 % |

Märkus: Korduvaid opereerimata õlaliigese nihestusi ja habituaalset luksatsiooni ja selle retsidiivi ei loeta kindlustusjuhtumiks.

41. Õlavöötme vigastuse järgne:

- | | |
|---|------|
| 1. õlaliigese kontratuur: | |
| a) keskmise raskusega (tõstab kätt ette kuni 90 kraadi) | 10 % |
| b) raske (tõstab kätt ette kuni 45 kraadi) | 20 % |
| c) abduktsioon, 0-45 kraadi | 10 % |

Küünarliiges ja -vars Protsent

43. Küünarliigese vigastused

- 1) luufragmentide (k.a epikondüluste) rebimismurd, küünar- või kodarluu murd liigeses, luksatsioon küünarliigesest 5 %
- 2) küünar- ja kodarluu murd liigeses 10 %
- 3) õlavarreluu murd distaalse metafüüsi osas 15 %
- 4) õlavarreluu murd koos küünar- ja kodarluu murruga 20 %

44. Küünarliigese vigastuse järgne

- 1) küünarliigese kontraktuur supinatsiooni - pronatsiooni säilimisega
- a) kerge (painutus 50-60 kraadi, sirutus 160-175 kraadi) 10 %
- b) keskmise raskusega (painutus 65-90 kraadi, sirutus 140-155 kraadi) 20 %
- c) tugev (painutus üle 90 kraadi, sirutus alla 140 kraadi) 25 %

45. Küünarvarre luude murd

- 1) ühe luu murd 5 %
- 2) kahe luu murd, ühe luu hulgimurd 10 %

46. Ebaliiges

- 1) ühel luul 10 %
- 2) kahel luul 25 %

47. Randmeliigese vigastused

- 1) luukillu (kildude) ärarebimismurd, tikkeljätke murrud, ühe luu murd, kodarluu murd tüüpilisest kohast (in loco typica) 5 %
- 2) kahe või enama luu murd randmeliigeses 10 %
- 3) perilunaarne nihestus 15 %

48. Randmeliigese kontraktuur

- 1) kerge (sirutus-painutuse liikuvus 55 kraadi) 5 %
- 2) keskmise raskusega (sirutus-painutuse liikuvus 40-50 kraadi) 10 %
- 3) tugev (liikuvus 20-35 kraadi) 15 %

49. Randme-, kämbaluude vigastused

- 1) ühe luu murd (v.a lodiluu) 5 %
- 2) kahe ja enama luu murd 10 %
- 3) lodiluu murd 8 %
- 4) randme nihestus-murd, randmeliigese ebastabiilsus sidemete vigastusest 10 %

50. Vigastuse järgne lodiluu ebaliiges 12 %

Pöial Protsent

51. Pöidla vigastus:

- 1) sirutajakõõluse rebend 3 %
- 2) lülide murd, painutajakõõluse rebend, kõõluse-, liigese- või luuline panariitsium 5 %

II-III-IV-V sõrm Protsent

52. Ühe või mitme distaalse, keskmise või proksimaalse lüli murd, painutaja- või sirutaja- kõõluse rebend, liigese-, kõõluse- või luuline panariitsium 3 %

Vaagen, puusaliiges Protsent

53. Vaagna vigastused:

- 1) ühe luu murd 5 %
- 2) kahe luu murd, ühe luu hulgimurd, ühe liiduse rebend 10 %
- 3) kolme või enama luu murd, kahe või enama liiduse rebend 15 %

54. Puusaliigese vigastused:

- 1) luuliste fragmentide ärarebimismurd 5 %
- 2) isoleeritud pöõra(te) murd 10 %

3) puusaliigese nihetus	15 %
4) reieluu pea, kaela, proksimaalse metafüüsi murd, liigesenapa murd %	25

55. Puusaliigese vigastuse järgne:

1) kerge kontraktuur (liikuvus kuni 90 kraadi sirutus-asendist)	10 %
2) keskmise raskusega kontraktuur (liikuvus kuni 60 kraadi sirutusasendist)	15 %
3) tugev kontraktuur (liikuvus kuni 30 kraadi sirutusasendist)	20 %
4) reieluukaela ebaliiges	15 %

Reis

56. Reieluu murd:

1) diafüüsi osas	25 %
2) hulгимurd	30 %

Põlveliiges

57. Põlveliigese vigastused:

1) operatsioonil tõestatud värske meniskirebend	3 %
2) luuliste fragmentide ärarebimismurd, pindluu pähiku murd, operatsioonil ja/või uuringul tõestatud ristisideme rebend	5 %
3) põlvekedra, sääreluu põntadevahelise välja, põntade, sääreluu proksimaalse metafüüsi murd	10 %
4) sääreluu, proksimaalse metafüüsi murd koos pindluu pähiku murruga	15 %
5) reieluu põnda (põntade) murd, sääre nihetus (vt punkt 95)	20 %
6) reieluu distaalse metafüüsi murd	25 %
7) reieluu distaalse metafüüsi ja sääreluu proksimaalse metafüüsi, pindluu pähiku murd	30 %

58. Põlveliigese vigastuse järgne:

1) kerge kontraktuur (liikuvus kuni 90 kraadi sirutus-asendist)	10 %
2) keskmise raskusega kontraktuur (liikuvus kuni 60 kraadi sirutusasendist)	20 %
3) tugev kontraktuur (liikuvus kuni 30 kraadi sirutus-asendist)	30 %

Säär

59. Sääreluude diafüüsi murd:

1) pindluu murd, luufragmentide ärarebimine	5 %
2) sääreluu murd, pindluu hulгимurd	10 %
3) sääre- ja pindluu murd, sääreluu hulгимurd	15 %

60. Sääreluude murru järgne ebaliiges:

1) sääreluul	10 %
2) pind- ja sääreluul	15 %

Hüppeliiges

61. Hüppeliigese vigastus:

1) ühe päksi murd, sääreluu-pindluu vahelise sündesmoosi rebend	5 %
2) bimalleolaarne murd, ühe päksi ja sääreluu serva murd	10 %
3) mõlema päksi ja sääreluu serva murd	15 %
4) fiktsiooni vajav hüppeliigese vigastus (fiktsioon üle 3 nädala)	5 %

62. Kannakõõluse rebend

10 %

Pöid

63. Pöia vigastused:

1) ühe luu murd (v.a kand- ja kontsluu), nihetus (vt punkt 95)	5 %
2) kandluu murd, kontsluu murd, kahe või enama põialabalu murd	10 %

Varbad

Protsent

64. Ühe või mitme distaalse, keskmise või proksimaalse varbalüli murd:

1) 1-2 varbal	2 %
2) 3-5 varbal	5 %

65. Osteomüeliit lahtiste murdude tüsistusena

10 %

Muud vigastused

Protsent

66. Traumaatiline, hemorraagiline šokk, põletushaigus

10 %

67. Juhuslikud ägedad kemikaalimürgitused, vingumürgitus ja elektritraumad:

1) haiglaraviga 5-10 päeva	5 %
2) haiglaraviga 11-20 päeva	10 %
3) haiglaraviga üle 20 päeva	15 %

68. Nihetused - kompenseerimisel võetakse aluseks 50% tabelis toodud protsendist

Nägemistervamuse languse tabel

Lisa punktile 11.

enne traumat	nägemisteravus pärast traumat				
	0,4	0,3,2	0,1	Alla 0,1	0,0
0,70,60,5	10 %	15 %	20 %	25 %	35 %
1,0-0,83 %5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	35 %
0,7-3 %5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	35 %
0,6-3 %	10 %	15 %	20 %	25 %	35 %
0,5---	10 %	15 %	20 %	25 %	35 %
0,4---	10 %	15 %	20 %	25 %	35 %
0,3---	10 %	15 %	20 %	25 %	35 %
0,2---	10 %	15 %	20 %	25 %	35 %
0,1---	10 %	15 %	20 %	25 %	35 %
alla 0,1---	10 %	15 %	20 %	25 %	35 %

2. Püsiv puue

Närvisüsteemi kahjustused

Protsent

1. Pea, seljaaju ja perifeerse närvisüsteemi kahjustused

1) monoparees (ülemine, alumine)	25 %
2) hemi- ja/või paraparees	40 %
3) tetraparees, koordinatsioonivõime kaotus, dementsus	70 %
4) monoplegia	60 %
5) hemi-, para- või tetraplegia, dekortikatsiooni sündroom	100 %
6) vaagnaelundite funktsiooni häired, sõltuvalt organist ja häire ulatusest lisatakse kuni	70 %

2. Kraniaalnärvi püsiv halvatus

10 %

3. Perifeersetes närvide läbilõike sündroom

1) kodar-, küünar- või keskmiknärvi läbilõike käsivarre ja/või randmeliigse kõrgusel; sääre-, pindluunärvi läbilõike sääre ja/või hüppeliigese kõrgusel	10 %
2) kahe või enama närvi läbilõike eelmises punktis toodud kõrgusel	20 %
3) ühe närvi läbilõike õlavarre või reie kõrgusel	25 %
4) kahe või enama närvi läbilõike eelmises punktis toodud kõrgusel	40 %

Nägemisorganid **Protsent**

4. Ühe silma akommodatsioonihalvatus 15 %

5. Hemianopsia (ühe silma vaatevälja ahenemine poolses ulatuses), silmalihaste vigastusest tekkinud traumaatiline kõõrdsilmsus, ptoos, diploopia, vaatevälja kontsentriiline ahenemine 15 %

6. Ühe silma pulseeriv eksoftalm 20 %

7. Nägemisvõime kaotus

- 1) ühe silma nägemisvõime täielik kaotus 50 %
- 2) ainsa silma nägemisvõime täielik kaotus 100 %

Märkus: Nägemisorganite vigastuse suurus määratakse ravijärgselt, mitte varem kui 3 kuud pärast kindlustusjuhtumit, järelkontrollis täidetud arstitõendi alusel.

Kuulmisorganid **Protsent**

8. Kõrvalesta puudumine

- 1) poolses ulatuses või kõrvalesta väliskuju muutus trauma tagajärjel vähemalt poole võrra 10 %
- 2) täies ulatuses 20 %

9. Kuulmisteravuse langus ühest kõrvast

- 1) üle 90 db 10 %
- 2) ühe kõrva kurtus 20 %
- 3) mõlema kõrva kurtus 50 %

Märkus: Kuulmisteravuse langus määratakse audiomeetriliselt ravijärgselt, mitte varem kui 3 kuud pärast kindlustusjuhtumit.

Hingamisorganid **Protsent**

10. Kopsu eemaldamine

- 1) kopsusagara või osaline kopsu eemaldamine 20 %
- 2) ühe kopsu eemaldamine 35 %

11. Kõri, hingetoru vigastused trahheostoomia kanüüli pideva vajadusega 20 %

Seedetrakt **Protsent**

12. Keele amputatsioon

- 1) distaalses kolmandikus 15 %
- 2) keskmises kolmandikus 30 %
- 3) täies ulatuses 60 %

13. Söögitoru vigastuse järgne

- 1) ahenemine (läbitav vedelale toidule) 40 %
- 2) läbimatus (gastrostoom) 60 %

14. Vigastuse järgne kolostoomia 75 %

15. Maksa osaline eemaldamine (resektsioon) trauma tõttu 15 %

16. Põrna eemaldamine trauma tõttu 8 %

17. Seedetrakti vigastuse järgne mao eemaldamine 60 %

Eritus- ja suguorganite süsteem **Protsent**

18. Neerude vigastused

- 1) neeru osaline eemaldamine 5 %
- 2) ühe neeru eemaldamine 10 %

19. Kuseteede vigastuse järgne

- 1) kusepõie mahu vähenemine 1-10 %
- 2) toksiline glomerulonefriit, kuseteede ahenemine 25 %
- 3) traumaatiline toksikoos, cruch-sündroom, krooniline neerupuudulikkus 30 %
- 4) kuseteede läbimatus, kuse-suguelundite uurised 40 %

20. Viljatuks tegev suguorgani kahjustus 25 %

Lüüsammas **Protsent**

21. Kaelalülide täielik liikumatus murru tagajärjel 25 %

Õlaliiges **Protsent**

22. Õlaliigese anküloos ebasoodsas asendis 30 %

23. Õlavarreluu murru järgne ebaliiges 30 %

24. Õlavarre traumaatiline amputatsioon

- 1) eksartikulatsioon õlaliigesest 80 %
- 2) õlavarre mis tahes osas 75 %
- 3) ainsa ülajäseme täielik amputatsioon 100 %

Küünarliiges ja -vars **Protsent**

25. Küünarliigese vigastuse järgne

- 1) küünarliigese anküloos
 - a) optimaalses asendis 90-110 kraadi 10 %
 - b) maksimaalses pronatsioonil lisatakse kuni 15 %
 - c) maksimaalses supinatsioonil lisatakse kuni 20 %
- 2) "logisev" ehk ebastabiilne liiges (liigespindade resektsioonist) 20 %

26. Küünarvarre traumaatiline amputatsioon

- 1) eksartikulatsioon küünarliigeses 70 %
- 2) küünarvarre amputatsioon mis tahes kõrgusel 60 %
- 3) ainsa jäseme traumaatiline amputatsioon küünarvarre kõrgusel 100 %

27. Randmeliigese anküloos

- 1) soodsas asendis (20 kraadi flektsiooni kuni 20 kraadi ekstensiooni) 15 %
- 2) ebasoodsas asendis 25 %

28. Vigastuse järgne labakäe amputatsioon

- 1) kõigi sõrmede või labakäe traumaatiline amputatsioon 55 %
- 2) ainsa labakäe traumaatiline amputatsioon 100 %

Pöial **Protsent**

- | | |
|----------------------------|------|
| 1) anküloos ühes liigeses | 5 % |
| 2) anküloos kahes liigeses | 10 % |

30. Pöidla amputatsioon

- | | |
|--|------|
| 1) küüslülist või lülidevahelisest liigesest | 15 % |
| 2) põhilülist või metakarpofalangeaalliigesest | 20 % |
| 3) koos kämbaluuga | 25 % |

II-III-IV-V sõrm**Protsent****31. Sõrmede vigastuse järgne**

- | | |
|---------------------------------------|-----|
| 1) anküloos ühes liigeses | 5 % |
| 2) iga järgneva liigese eest lisandub | 2 % |

32. Nimetissõrme amputatsioon

- | | |
|--------------------|------|
| 1) küüslülist | 5 % |
| 2) kesklülist | 7 % |
| 3) põhilülist | 10 % |
| 4) koos kämbaluuga | 15 % |

33. III, IV, V sõrme amputatsioon

- | | |
|--------------------|------|
| 1) küüslüülist | 2 % |
| 2) kesklüülist | 3 % |
| 3) põhilüülist | 5 % |
| 4) koos kämbaluuga | 10 % |

Vaagen, puusaliiges**Protsent**

- | | |
|--|-------------|
| 34. Vaagna hemipelvektoomia trauma tagajärjel | 75 % |
|--|-------------|

35. Puusaliigese vigastuse järgne

- | | |
|--|------|
| 1) anküloos soodsas asendis (30 kraadi flektsiooni, 0 - 5 kraadi aduktsiooni, 10 - 15 kraadi välisrotatsiooni) | 25 % |
| 2) anküloos ebasoodsas asendis | 35 % |

Reis**Protsent**

- | | |
|--|-------------|
| 36. Reieluu murrujärgne ebaliiges | 25 % |
|--|-------------|

37. Reie traumaatiline amputatsioon

- | | |
|--|-------|
| 1) ühel jäsemel puusaliigesest, reie ülemine kolmandik | 70 % |
| 2) reie keskmine või alumine kolmandik | 60 % |
| 3) ainsal jäsemel | 100 % |

Põlveliiges**Protsent****38. Põlveliigese vigastuse järgne**

- | | |
|---|------|
| 1) liigese anküloos soodsas asendis (flektsioon 0 kuni 15 kraadi) | 10 % |
| 2) liigese anküloos ebasoodsas asendis | 20 % |

Säär**Protsent****39. Sääre traumaatiline amputatsioon**

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1) mis tahes kõrgusel | 45 % |
| 2) eksartikulatsioon põlveliigesest | 50 % |
| 3) ainsal jäsemel | 100 % |

Hüppeliiges**Protsent****40. Hüppeliigese vigastuse järgne**

- | | |
|--|------|
| 1) anküloos soodsas asendis (0 kraadi plantaarflektsiooni kuni 10 kraadi dorsaalflektsiooni) | 15 % |
| 2) anküloos ebasoodsas asendis | 25 % |
| 3) ülemise hüppeliigese kontraktuur liikuvusega alla 15 kraadi | 10 % |
| 4) eksartikulatsioon ülemisest hüppeliigesest | 40 % |

Pöid**Protsent****41. Pöia vigastuse järgne**

- | | |
|--|------|
| 1) anküloos soodsas asendis (0 kraadi plantaarflektsiooni kuni 10 kraadi dorsaalflektsiooni) | 10 % |
| 2) anküloos ebasoodsas asendis | 10 % |
| 3) ülemise hüppeliigese kontraktuur liikuvusega alla 15 kraadi | 15 % |
| 4) eksartikulatsioon ülemisest hüppeliigesest | 25 % |

Varbad**Protsent****42. Traumaatiline amputatsioon**

- | | |
|---|-----|
| 1) suurvarba küüslüülist | 3 % |
| 2) suurvarba põhilüülist | 5 % |
| 3) iga II-V varba kaotus (amputatsioon põhilüülist) | 2 % |