



ТАБЛИЦА ДАННЫХ О ВОЗМЕЩЕНИЯХ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ПОТЕРИ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАМКАХ СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Действует начиная с 21.03.2017

| Номер | Повреждение | Максимальный размер возмещения в случае причинения вреда здоровью, % | Максимальный размер возмещения в случае потери трудоспособности, % |
|-----------|--|--|--|
| 1. | Повреждения черепа | | |
| 1.1. | Переломы костей черепа | | |
| | 1) перелом свода черепа | 10 % | |
| | 2) перелом основания черепа | 15 % | |
| | 3) перелом свода и основания черепа | 20 % | |
| 1.2. | Внутричерепные кровоизлияния | | |
| | 1) эпидуральное | 10 % | |
| | 2) субдуральное, внутримозговое | 15 % | |
| 1.3. | Повреждения головного мозга | | |
| | 1) сотрясение мозга или компрессия | 2 % | |
| | 2) сотрясение мозга, субарахноидальное кровоизлияние (контузия) | 10 % | |
| 1.4. | Повреждения головы, спинного мозга и периферийной нервной системы | | |
| | 1) сотрясение спинного мозга | 7 % | |
| | 2) травматическая эпилепсия | 15 % | |
| | 3) монопарез (верхний, нижний) | | 30 % |
| | 4) геми- и/или парапарез | | 40 % |
| | 5) тетрапарез, потеря координации, деменция | | 70 % |
| | 6) моноплегия | | 60 % |
| | 7) геми-, пара- или тетраплегия, синдром декорткации | | 100 % |
| | 8) нарушения функции тазовых органов, в зависимости от органа и серьезности нарушения добавляется до | | 70 % |
| 1.5. | Стойкий паралич черепного нерва | | 10 % |
| 1.6. | Травматический плексит | 10 % | |
| 1.7. | Синдром нарушения проводимости периферических нервов | | |
| | 1) нарушение проводимости лучевого, локтевого или срединного нерва на высоте руки и/или лучезапястного сустава; нарушение проводимости нерва голени, нерва малоберцовой кости на высоте голени и/или голеностопа | | 10 % |
| | 2) нарушение проводимости двух или более нервов на высоте, указанной в предыдущем пункте | | 20 % |
| | 3) нарушение проводимости одного нерва на высоте плеча или бедра | | 25 % |
| | 4) нарушение проводимости двух или более нервов на высоте, указанной в предыдущем пункте | | 40 % |
| 2. | Органы зрения | | |
| 2.1. | Паралич аккомодации одного глаза | | 15 % |
| 2.2. | Гемианопсия (сужение поля зрения одного глаза наполовину), травматическое косоглазие, возникшее в результате повреждения глазных мышц, птоз, диплопия, концентрическое сужение поля зрения | | 15 % |
| 2.3. | Пульсирующий экзофтальм одного глаза | | 20 % |
| 2.4. | Непроходимость слезных каналов одного глаза | 10 % | |
| 2.5. | После травмы глаза | | |
| | 1) конъюнктивит, кератит, иридоциклит, хориоретинит | 5 % | |

| | | | |
|-----------|--|-------------|-------|
| | 2) дефект радужной оболочки, люксия хрусталика, трихиаз, заворот века, неизвлеченные инородные тела в глазном яблоке | 10 % | |
| 2.6. | Сквозные раны оболочки глаза, ожог II-III степени (разъедание), гемофтальм без снижения остроты зрения | 5 % | |
| 2.7. | Потеря зрения (в случае предшествующего ухудшения зрения возмещение рассчитывается исходя из пункта 2.10) | | |
| | 1) полная потеря зрения на один глаз | | 50 % |
| | 2) полная потеря зрения на единственный глаз | | 100 % |
| 2.8. | Удаление глазного яблока (энуклеация) | 10 % | |
| 2.9. | Перелом стенки орбиты | 10 % | |
| 2.10. | Данные о возмещении в случае снижения остроты зрения приведены в таблице | См. таблицу | |
| | Примечание. Степень повреждения органов зрения определяется спустя 3 месяца после наступления страхового случая, дополнительный контроль проводится на основании медицинской справки. | | |
| 3. | Органы слуха | | |
| 3.1. | Отсутствие ушной раковины | | |
| | 1) наполовину или внешний вид ушной раковины в результате травмы изменился по меньшей мере наполовину | | 10 % |
| | 2) полностью | | 20 % |
| 3.2. | Снижение остроты слуха на одно ухо | | |
| | 1) 60–89 дБ | 5 % | |
| | 2) более 90 дБ | | 10 % |
| | 3) глухота на одно ухо | | 20 % |
| | 4) глухота на оба уха | | 50 % |
| | Примечание. Снижение остроты слуха определяется с помощью аудиометрии спустя 3 месяца после наступления страхового случая. | | |
| 3.3. | Травматический разрыв одной барабанной перепонки (без снижения остроты слуха) | 5 % | |
| 4. | Органы дыхания | | |
| 4.1. | Перелом носовой кости, передней стенки лобной и придаточной пазухи носа | 3 % | |
| 4.2. | Повреждение легкого, подкожная эмфизема, гемо-, пневмоторакс, экссудативный плеврит, инородное тело в грудной полости, пневмония (за исключением гипостатической или послеоперационной) | | |
| | 1) одностороннее | 5 % | |
| | 2) двустороннее | 10 % | |
| 4.3. | В результате травмы | | |
| | 1) удаление доли легкого или частичное удаление легкого | | 20 % |
| | 2) удаление одного легкого | | 35 % |
| 4.4. | Перелом грудной кости | 5 % | |
| 4.5. | Перелом одного ребра, подтвержденный на основании результатов рентгенографии | 2 % | |
| 4.6. | Проведенная в связи с травмой (не возмещается в случае пункта 4.3) | | |
| | 1) торакоскопия, торакоцентез | 5 % | |
| | 2) торакотомия | 10 % | |
| 4.7. | Повреждения гортани, дыхательного горла (трахеи), бронхоскопия, трахеотомия | 5 % | |
| 4.8. | Повреждения гортани, дыхательного горла с необходимостью установки постоянной трахеостомической канюли | | 20 % |
| 5. | Сердечно-сосудистая система | | |
| 5.1. | Повреждения сердца, оболочек сердца и крупных магистральных кровеносных сосудов | 25 % | |

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| | 1) возникшая вследствие повреждений сердца, оболочек сердца, крупных магистральных кровеносных сосудов и периферических кровеносных сосудов | | |
| | a) сердечная недостаточность, III степень в соответствии с классификацией NYHA/Нью-Йоркской кардиологической ассоциации 1964 года | 20 % | |
| | b) сердечная недостаточность, IV степень в соответствии с классификацией NYHA 1964 года | 25 % | |
| 6. | Пищеварительный тракт | | |
| 6.1. | Перелом скуловой кости, верхней, нижней челюстей, вывих (см. пункт 22.3) | | |
| | 1) одной кости | 5 % | |
| | 2) нескольких костей, множественный перелом | 10 % | |
| | Примечание. Обычный вывих и его рецидивы не считаются страховым случаем. | | |
| 6.2. | Повреждения языка (ампутация) | | |
| | 1) в дистальной трети (дистальная 1/3) | | 15 % |
| | 2) в средней трети (дистальная 2/3) | | 30 % |
| | 3) в полном объеме | | 60 % |
| 6.3. | Повреждения глотки, пищевода, желудка, кишечника (рана, разрыв, ожог), эзофагоскопия и гастроскопия | 5 % | |
| 6.4. | После повреждения пищевода | | |
| | 1) сужение (проходит жидкая пища) | | 40 % |
| | 2) непроходимость (гастростом) | | 60 % |
| 6.5. | После повреждения | | |
| | 1) обусловленное рубцеванием сужение желудка, кишечника, ануса | 15 % | |
| | 2) сопутствующее заболевание | 25 % | |
| | 3) кишечный, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы | 50 % | |
| | 4) колостомиа | | 75 % |
| 6.6. | Повреждения или поражение печени в результате случайного острого отравления | | |
| | 1) сывороточный гепатит, возникший в ходе лечения травмы | 5 % | |
| | 2) печеночная недостаточность | 10 % | |
| 6.7. | В результате травмы | | |
| | 1) субкапсулярный разрыв печени, без операции, диагностируется на основании результатов КТ/компьютерной томографии или УЗИ/ультразвукового исследования | 5 % | |
| | 2) наложение швов на месте разрыва печени | 10 % | |
| | 3) перитонит при разрыве желчного пузыря | 15 % | |
| | 4) частичное удаление печени (резекция) | | 15 % |
| 6.8. | Повреждения селезенки | | 15 % |
| | 1) субкапсулярный разрыв, без операции, диагностируется на основании результатов КТ или УЗИ | 5 % | |
| | 2) удаление селезенки | | 8 % |
| 6.9. | После повреждения пищеварительного тракта | | |
| | 1) наложение швов на желудок, поджелудочную железу, кишечник | 15 % | |
| | 2) ложная фистула поджелудочной железы | 20 % | |
| | 3) резекция желудка, кишечника, поджелудочной железы | 30 % | |
| | 4) удаление желудка | | 60 % |
| 6.10. | Вследствие повреждения живота с целью диагностики проведена (не прибавляется к пунктам 6.3–6.9) | | |
| | 1) лапароскопия (лапароцентез) | 5 % | |
| | 2) лапаротомия | 10 % | |

| | | | |
|-----------|--|--------|------|
| | Примечание. Пункты 6.3–6.6 должны быть продиагностированы с помощью эндоскопии, лапароскопии или лапаротомии. | | |
| 7. | Выделительная и половая системы | | |
| 7.1. | Повреждения почек | | |
| | 1) субкапсулярный разрыв, без операции, диагностируется на основании результатов КТ или УЗИ | 5 % | |
| | 2) наложение швов на почку | 10 % | |
| | 3) частичное удаление почки | | 5 % |
| | 4) удаление одной почки | | 10 % |
| 7.2. | После повреждений мочевыводящих путей | | |
| | 1) уменьшение объема мочевого пузыря | | 10 % |
| | 2) токсический гломерулонефрит, сужение мочевыводящих путей | | 25 % |
| | 3) травматический токсикоз, синдром длительного сдавления, хроническая почечная недостаточность | | 30 % |
| | 4) непроходимость мочевыводящих путей, мочеполовые свищи | | 40 % |
| 7.3. | Операции на мочевыводящих путях | | |
| | 1) эпицистостомия | 5 % | |
| | 2) наложение швов на мочевыводящие пути, люмботомия | 10 % | |
| 7.4. | Повреждения мочеполовых органов | | |
| | 1) раны, разрывы, ожоги, обморожение | 5 % | |
| 7.5. | В результате травмы | | |
| | 1) удаление одного яичка, яичника, яйцевода | 15 % | |
| | 2) удаление обоих яичек, части полового члена, обоих яичников, яйцевода | | 30 % |
| | 3) удаление матки | | |
| | а) в случае застрахованного лица возрастом до 40 лет | | 50 % |
| | б) в случае застрахованного лица возрастом более 40 лет | | 10 % |
| | 4) удаление полового члена и обоих яичек | | 50 % |
| 8. | Мягкие ткани | | |
| 8.1. | Косметические дефекты, обусловленные шрамами на поверхности лица, шеи | | |
| | 1) выраженные (существенно не меняют облик), шрамы площадью более 1 см ² | 1–10 % | |
| | 2) сильно выраженные (существенно меняют облик) | 30 % | |
| | 3) полное искажение лица (лицо-маска) | 70 % | |
| 8.2. | Шрамы от ожогов на теле с выжаренным келоидом | | |
| | 1) 1–2 % площади тела | 10 % | |
| | 2) 3–4 % площади тела | 15 % | |
| | 3) 5–6 % площади тела | 20 % | |
| | 4) 7–8 % площади тела | 25 % | |
| | 5) 9–10 % площади тела | 30 % | |
| | 6) Более 10 % площади тела | 35 % | |
| | Примечание. Степень повреждения мягких тканей определяется спустя 3 месяца после наступления страхового случая. В случае повреждения, указанного в подпункте 1 пункта 8.1, 1 см ² шрама дает право на 1 % возмещения в случае причинения вреда здоровью. | | |
| 9. | Позвоночник | | |
| 9.1. | Перелом тел позвонков, позвоночных дуг, суставных отростков позвонков | | |
| | 1) На одном позвонке | 5 % | |

| | | | |
|------------|---|------|-------|
| | 2) На двух позвонках | 10 % | |
| | 3) На трех или более позвонках | 25 % | |
| 9.2. | Перелом поперечного или остистого отростка одного позвонка | 3 % | |
| 9.3. | Перелом крестца | 10 % | |
| 9.4. | Перелом, вывих копчика (см. пункт 22.3) | 5 % | |
| 9.5. | Полная неподвижность шейных позвонков вследствие перелома | | 25 % |
| 10. | Лопатка и ключица | | |
| 10.1. | Перелом лопатки, ключицы, разрыв акромиально-ключичного, грудино-ключичного сочленения | | |
| | 1) перелом одной кости, разрыв одного сочленения | 5 % | |
| | 2) перелом двух костей вместе с разрывом одного сочленения | 10 % | |
| | 3) полный разрыв двух сочленений, полный разрыв двух сочленений вместе с вывихом или с переломом одной кости или с переломом одной кости и вывихом, перелом двух костей вместе с разрывом одного сочленения и вывихом | 15 % | |
| | 4) ложный сустав ключицы | 10 % | |
| 11. | Плечевой сустав | | |
| 11.1. | Повреждения плечевого сустава | | |
| | 1) перелом с отрывом фрагментов кости, вывих (см. пункт 22.3) | 5 % | |
| | 2) перелом двух костей, перелом лопатки с вывихом плечевого сустава, в ходе исследований обнаружен РАЗРЫВ сухожилий и/или СУСТАВНОЙ КАПСУЛЫ | 10 % | |
| | 3) перелом головки, хирургической или анатомической шейки плечевой кости, перелом суставной чаши, перелом плечевой кости вместе с вывихом | 15 % | |
| | 4) множественный раздробленный перелом плечевой кости в плечевом суставе | 20 % | |
| | Примечание. Неоднократные вывихи неоперируемого плечевого сустава не считаются страховым случаем. | | |
| 11.2. | После повреждения плечевого сустава | | |
| | 1) анкилоз плечевого сустава в хорошем положении (25–40 градусов абдукции, 20–30 градусов флексии, 25–30 градусов внутренней ротации) | | 20 % |
| | 2) анкилоз плечевого сустава в плохом положении | | 30 % |
| | 3) контрактура плечевого сустава | | |
| | а) легкая (поднимает руку перед собой до 120 градусов) | 5 % | |
| | б) средней тяжести (поднимает руку перед собой до 90 градусов) | 10 % | |
| | в) тяжелая (поднимает руку перед собой до 45 градусов) | 20 % | |
| | д) абдукция, 0–45 градусов, прибавляется до | 10 % | |
| 11.3. | Плечевая кость | | |
| | 1) перелом диафиза | 15 % | |
| | 2) множественный перелом | 20 % | |
| | 3) ложный сустав после перелома | | 30 % |
| 11.4. | Ампутация плеча | | |
| | 1) экзартикуляция от плечевого сустава | | 80 % |
| | 2) в любой части плеча | | 75 % |
| | 3) травматическая ампутация единственной верхней конечности | | 100 % |
| 12. | Локтевой сустав и предплечье | | |
| 12.1. | Повреждения локтевого сустава | | |

| | | | |
|-------|--|------|-------|
| | 1) перелом с отрывом фрагментов кости (включая эпикондилитные), перелом локтевой и лучевой кости в суставе, вывих одной кости (см. пункт 24.3), люккация от локтевого сустава | 5 % | |
| | 2) перелом локтевой и лучевой кости в суставе, вывих обеих костей (см. пункт 24.3) | 10 % | |
| | 3) Перелом плечевой кости в части дистального метафиза | 15 % | |
| | 4) перелом плечевой кости вместе с переломом локтевой и лучевой кости | 20 % | |
| 12.2. | После повреждения локтевого сустава | | |
| | 1) анкилоз локтевого сустава | | |
| | а) в оптимальном положении 90–110 градусов | | 10 % |
| | б) при максимальной пронации прибавляется до | | 15 % |
| | с) при максимальной супинации прибавляется до | | 20 % |
| | Внимание! Оптимальной считается пронация 10–20 градусов | | |
| | 2) разболтанный или нестабильный сустав (из-за резекции суставной поверхности) | | 20 % |
| | 3) контрактура локтевого сустава с сохранением супинации-пронации | | |
| | а) легкая (сгибание на 50–60 градусов, разгибание на 160–175 градусов) | 10 % | |
| | б) средней тяжести (сгибание на 65–90 градусов, разгибание на 140–155 градусов) | 20 % | |
| | с) тяжелая (сгибание на более чем 90 градусов, разгибание на менее чем 140 градусов) | 25 % | |
| 12.3. | Перелом костей предплечья | | |
| | 1) перелом одной кости | 5 % | |
| | 2) двух костей | 10 % | |
| 12.4. | Травматическая ампутация предплечья | | |
| | 1) одной кости | 10 % | |
| | 2) двух костей | 25 % | |
| 12.5. | Травматическая ампутация предплечья | | |
| | 1) экзартикуляция в локтевом суставе | | 70 % |
| | 2) ампутация предплечья с любого уровня | | 60 % |
| | 3) травматическая ампутация единственной конечности с уровня предплечья | | 100 % |
| 12.6. | Повреждение лучезапястного сустава | | |
| | 1) отрывной перелом осколка (осколков) кости, переломы шиловидного отростка, перелом одной кости, вывих головки локтевой кости (см. пункт 22.3), перелом лучевой кости в типичном месте (in loco typica) | 5 % | |
| | 2) перелом двух или более костей в лучезапястном суставе | 10 % | |
| | 3) перилунарный вывих | 15 % | |
| 12.7. | Анкилоз лучезапястного сустава | | |
| | 1) в хорошем положении (от 20 градусов флексии до 20 градусов экстензии) | | 15 % |
| | 2) в плохом положении | | 20 % |
| 12.8. | Контрактура лучезапястного сустава | | |
| | 1) легкая (подвижность при сгибании-разгибании 55 градусов и более) | 5 % | |
| | 2) средней тяжести (подвижность при сгибании-разгибании 40–50 градусов) | 10 % | |
| | 3) средней тяжести (подвижность при сгибании-разгибании 40–50 градусов) | 15 % | |
| 12.9. | Повреждения костей запястья, пястных костей | | |
| | 1) перелом одной кости (не считая ладьевидной кости) | 5 % | |
| | 2) перелом двух или более костей | 10 % | |
| | 3) перелом ладьевидной кости | 8 % | |

| | | | |
|------------|---|------|-------|
| | 4) вывих запястья (см. пункт 22.3), вывих-перелом, нестабильность лучезапястного сустава в результате повреждения связок | 10 % | |
| 12.10. | После повреждения | | |
| | 1) ложный сустав ладьевидной кости | 5 % | |
| | 2) травматическая ампутация всех пальцев или кисти руки | | 55 % |
| | 3) травматическая ампутация единственной кисти руки | | 100 % |
| 13. | Большой палец | | |
| 13.1. | Повреждение большого пальца | | |
| | 1) разрыв сухожилия разгибающей мышцы | 3 % | |
| | 2) перелом фаланг, вывих (см. пункт 22.3), разрыв сухожилия сгибающей мышцы, сухожильный, суставной или костный панариций | 5 % | |
| 13.2. | После повреждения большого пальца | | |
| | 1) анкилоз в одном суставе | | 5 % |
| | 2) анкилоз в двух суставах | | 10 % |
| 13.3. | Ампутация большого пальца | | |
| | 1) на уровне ногтевой фаланги | | 8 % |
| | 2) от пястно-фалангового сустава | | 15 % |
| | 3) от основной фаланги или пястно-фалангового сустава | | 20 % |
| | 4) вместе с I пястной костью | | 25 % |
| 14. | II, III, IV, V палец | | |
| 14.1. | Перелом одной или нескольких дистальных, средних или проксимальных фаланг, вывих (см. пункт 22.3), разрыв сухожилия сгибающей или разгибающей мышцы, сухожильный, суставной или костный панариций | 3 % | |
| 14.2. | После повреждения пальцев | | |
| | 1) анкилоз в одном суставе | | 5 % |
| | 2) за каждый следующий сустав прибавляется | | 2 % |
| 14.3. | Ампутация указательного пальца | | |
| | 1) от ногтевой фаланги | | 5 % |
| | 2) от средней фаланги | | 7 % |
| | 3) от основной фаланги | | 10 % |
| | 4) вместе с пястной костью | | 15 % |
| 14.4. | Ампутация III, IV, V пальца | | |
| | 1) от ногтевой фаланги | | 2 % |
| | 2) от средней фаланги | | 3 % |
| | 3) от основной фаланги | | 5 % |
| | 4) вместе с пястной костью | | 10 % |
| 15. | Таз, тазобедренный сустав | | |
| 15.1. | Повреждения таза | | |
| | 1) перелом одной кости | 5 % | |
| | 2) перелом двух костей, множественный перелом одной кости, разрыв одного сочленения | 10 % | |
| | 3) перелом трех или более костей, разрыв двух или более сочленений | 15 % | |
| | 4) гемипельвэктомия вследствие травмы | | 75 % |
| 15.2. | Повреждения тазобедренного сустава | | |
| | 1) перелом с отрывом костных фрагментов | 5 % | |

| | | | |
|------------|--|------|-------|
| | 2) изолированный перелом вертела/вертелов | 10 % | |
| | 3) вывих тазобедренного сустава | 15 % | |
| | 4) головка, шейка бедренной кости, перелом проксимального метафиза, перелом суставной чаши | 25 % | |
| 15.3. | После повреждения тазобедренного сустава | | |
| | 1) анкилоз | | |
| | а) в хорошем положении (30 градусов флексии, 0–5 градусов аддукции, 10–15 градусов внешней ротации) | | 25 % |
| | б) в плохом положении | | 35 % |
| | 2) легкая контрактура (подвижность до 90 градусов из разогнутого положения) | 10 % | |
| | 3) контрактура средней тяжести (подвижность до 60 градусов из разогнутого положения) | 15 % | |
| | 4) тяжелая контрактура (подвижность до 30 градусов из разогнутого положения) | 20 % | |
| | 5) ложный сустав шейки бедренной кости | 15 % | |
| 16. | Путешествие | | |
| 16.1. | Перелом бедренной кости | | |
| | 1) в части диафиза | 25 % | |
| | 2) множественный перелом | 30 % | |
| 16.2. | Ложный сустав после перелома бедренной кости | | 25 % |
| 16.3. | Травматическая ампутация бедра | | |
| | 1) от тазобедренного сустава одной конечности, верхняя треть бедра | | 70 % |
| | 2) средняя и нижняя треть бедра | | 60 % |
| | 3) единственной конечности | | 100 % |
| 17. | Коленный сустав | | |
| 17.1. | Повреждения коленного сустава | | |
| | 1) свежий разрыв мениска, подтвержденный в ходе операции | 3 % | |
| | 2) перелом с отрывом костных фрагментов, перелом головки малоберцовой кости, разрыв поперечной связки, подтвержденный в ходе операции и/или исследования | 5 % | |
| | 3) перелом коленной чашечки, межмыщелковой области большеберцовой кости, мыщелок, проксимального метафиза большеберцовой кости | 10 % | |
| | 4) перелом большеберцовой кости, проксимального метафиза вместе с переломом головки малоберцовой кости | 15 % | |
| | 5) перелом мыщелки (мыщелок) бедренной кости, вывих голени (см. пункт 22.3) | 20 % | |
| | 6) перелом дистального метафиза бедренной кости | 25 % | |
| | 7) перелом дистального метафиза бедренной кости и проксимального метафиза большеберцовой кости, головки малоберцовой кости | 30 % | |
| 17.2. | После повреждения коленного сустава | | |
| | 1) анкилоз сустава в хорошем положении (флексия от 0 до 15 градусов) | | 10 % |
| | 2) анкилоз сустава в плохом положении | | 20 % |
| | 3) легкая контрактура (подвижность до 90 градусов из разогнутого положения) | 10 % | |
| | 4) контрактура средней тяжести (подвижность до 60 градусов из разогнутого положения) | 20 % | |
| | 5) тяжелая контрактура (подвижность до 30 градусов из разогнутого положения) | 30 % | |
| 18. | Голень | | |
| 18.1. | Перелом диафиза большеберцовых костей | | |

| | | | |
|------------|--|------|-------|
| | 1) перелом малоберцовой кости, отрыв костных фрагментов | 5 % | |
| | 2) перелом большеберцовой кости, множественный перелом малоберцовой кости | 10 % | |
| | 3) перелом больше- и малоберцовой кости, множественный перелом большеберцовой кости | 15 % | |
| 18.2. | Ложный сустав после перелома большеберцовых костей | | |
| | 1) у большеберцовой кости | 10 % | |
| | 2) у мало- и большеберцовой кости | 15 % | |
| 18.3. | Травматическая ампутация голени | | |
| | 1) с любого уровня | | 45 % |
| | 2) экзартикуляция от коленного сустава | | 50 % |
| | 3) в случае единственной конечности | | 100 % |
| 19. | Голеностоп | | |
| 19.1. | Повреждение голеностопа | | |
| | 1) перелом одной лодыжки, разрыв межберцового синдесмоза | 5 % | |
| | 2) бималеолярный перелом, перелом одной лодыжки и края большеберцовой кости | 10 % | |
| | 3) перелом обеих лодыжек и края большеберцовой кости | 15 % | |
| | 4) повреждение голеностопа, нуждающееся в фиксации (фиксация более 3 недель) | 2 % | |
| 19.2. | После повреждения голеностопа | | |
| | 1) анкилоз в хорошем положении (от 0 градусов плантарфлексии до 10 градусов дорсифлексии) | | 15 % |
| | 2) анкилоз в плохом положении | | 25 % |
| | 3) контрактура верхнего голеностопа имеет подвижность менее 15 градусов | | 10 % |
| | 4) экзартикуляция от верхнего голеностопа | | 40 % |
| 19.3. | Разрыв пяточного сухожилия | 10 % | |
| 20. | Стопа | | |
| 20.1. | Повреждения стопы | | |
| | 1) перелом одной кости (не считая пяточной и таранной кости), вывих (см. пункт 22.3) | 5 % | |
| | 2) перелом пяточной кости, перелом таранной кости, перелом двух или более плюсневых костей стопы | 10 % | |
| 20.2. | После повреждения стопы | | |
| | 1) анкилоз от нижнего голеностопа | | 10 % |
| | 2) ампутация ото всех плюснефаланговых суставов | | 10 % |
| | 3) ампутация на уровне плюсневых костей, предплюсневых костей | | 15 % |
| | 4) лишение стопы от сустава Lisfranc или Chopart | | 25 % |
| 21. | Пальцы ног | | |
| 21.1. | Перелом одной или нескольких дистальных, центральных или проксимальных фаланг пальцев ног | | |
| | 1) на одном-двух пальцах | 2 % | |
| | 2) на 3-5 пальцах | 5 % | |
| 21.2. | Травматическая ампутация | | |
| | 1) от ногтевой фаланги большого пальца | | 3 % |
| | 2) от основной фаланги большого пальца | | 5 % |

| | | | |
|------------|--|------|-----|
| | 3) лишение каждого II–V пальца (ампутация от основной фаланги) | | 2 % |
| 21.3. | Остеомиелит в качестве осложнения открытых переломов | 10 % | |
| 22. | Прочие повреждения | | |
| 22.1. | Травматический, геморрагический шок, ожог | 10 % | |
| 22.2. | Случайные острые отравления химикатами, угарным газом и электрические травмы | | |
| | 1) со стационарным лечением продолжительностью 5–10 дней | 5 % | |
| | 2) со стационарным лечением продолжительностью 11–20 дней | 10 % | |
| | 3) со стационарным лечением более 20 дней | 15 % | |
| 22.3. | Вывихи составляют 50 % от указанных в таблице процентов | | |

Таблица показателей снижения остроты зрения

Приложение к пункту 2.10.

| Острота зрения до получения травмы | Острота зрения после получения травмы | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|-----------|------|--|
| | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | Менее 0,1 | 0,0 | |
| 1,0–0,8 | 3 % | 5 % | 10 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 35 % | 50 % | |
| 0,7 | - | 3 % | 5 % | 10 % | 10 % | 15 % | 20 % | 30 % | 40 % | |
| 0,6 | - | - | 3 % | 5 % | 10 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | |
| 0,5 | - | - | - | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % | 15 % | 20 % | |
| 0,4 | - | - | - | - | 5 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | |
| 0,3 | - | - | - | - | - | 5 % | 5 % | 10 % | 20 % | |
| 0,2 | - | - | - | - | - | - | 5 % | 10 % | 20 % | |
| 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 % | 20 % | |
| Менее 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | |

